

**Védőnői Szolgálat neve:** .....

Címe .....

Körzetazonosítója: .....

**Területi védőnő neve:** .....

Alapnyilvántartási száma: .....

Munkahelyi telefonszáma: ..... Munkahelyi mobilszáma: .....

Munkahelyi egyedi e-mail címe: .....

## **Védőnői tájékoztató a DTPa+IPV+Hib és a pneumococcus okozta betegségek elleni védőoltásról**

*[18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről]*

### **DTPa+IPV+Hib elleni védőoltás**

#### **Milyen betegségek ellen véd a DTPa+IPV+Hib védőoltás?**

A védőoltás 5 súlyos betegség a **torokgyík** (diftéria, D), a **merevgörcs** (tetanusz, T), a **szamárköhögés** (pertussis, Pa), a **járványos gyermekbénulás** (IPV) és a **b típusú Haemophilus influenzae fertőzés** (Hib) ellen véd.

#### **Mikor esedékes a DTPa+IPV+Hib védőoltás?**

A csecsemők 2, 3, 4, és 18 hónapos korban egy szúrással 5 betegség ellen kapnak védőoltást.

#### **Mire számíthat a DTPa+IPV+Hib elleni oltás után?**

Az oltás helyén mérsékelt duzzanat és bőrpír alakulhat ki. Az oltás után láz is jelentkezhet, ezért a testhőmérsékletet rendszeresen ellenőrizni kell, hogy időben el lehessen kezdeni a lázcsillapítást.

### **Diftéria**

#### **Milyen betegség a diftéria?**

A diftéria, más néven torokgyík, súlyos fertőző betegség, amelyet egy baktérium okoz. A torokgyík cseppfertőzéssel terjed.

#### **Melyek a diftéria tünetei?**

A diftéria torokfájással, lázzal, rossz közérzettel, rekedtséggel jár. A garatban, a gégen, a mandulákon, az orrban vaskos, szürke lepedéket képez, amely fulladást okozhat. A betegség súlyos lefolyású, a megbetegedettek negyede belehalhat a fertőzésbe.

### **Tetanusz**

#### **Milyen betegség a tetanusz?**

A tetanusz, más néven merevgörcs, egy súlyos, baktérium okozta betegség. A baktérium az emberi szervezetbe sérüléseken keresztül jut be, emberről-emberre nem terjed. Fertőzési veszélyt jelent az állati harapás, az égési sérülés, a vágott vagy szúrt seb is.

#### **Melyek a tetanusz tünetei?**

A tetanusz első tünete általában a szájzár, majd ezt követi a nyak és az arcizmok görcse, aminek hatására torz mosolyban rögzül az arc. Izommerevség alakul ki, amelyhez rohamokban jelentkező a gerinc és a végtagokra is kiterjedő izomgörcsök társulnak. Ezek csonttörést és akár a gerincoszlop törését is okozhatják. A gége és a légző izmok görcse fulladáshoz vezethet.

### **Szamárköhögés**

#### **Milyen betegség a szamárköhögés?**

A szamárköhögés egy baktérium okozta heveny fertőző betegség. A szamárköhögés cseppfertőzéssel terjed, leggyakrabban köhögéssel, tüszögéssel, vagy beteg emberrel hosszabb ideig, egy légtérben való tartózkodással.

### **Melyek a számarköhögés tünetei?**

A hurutos betegség kezdetén orrfolyás, hőemelkedés, kötőhártya gyulladás jelentkezhet. A kezdeti tüneteket több hetes száraz köhögés követheti. A kínzó, belégzést kísérő köhögésnek jellegzetes hangja van, innen ered a számarköhögés elnevezés. A csecsemők körében különösen nagy a veszélye a légzésleállásnak.

### **Járványos gyermekbénulás**

#### **Milyen betegség a járványos gyermekbénulás?**

A járványos gyermekbénulás egy heveny fertőző betegség, amelyet a poliovírus okoz. A vírus széklettel szennyezett kézzől, tárgyakról, élelmiszer, víz közvetítésével jut a szervezetbe.

#### **Melyek a járványos gyermekbénulás tünetei?**

A legtöbb esetben a betegség tünetmentes. A tünetes betegség rövid ideig tartó lázzal, felső légúti illetve hasmenéses tünetekkel kezdődik. Az esetek 5%-ban néhány napos láztalan időszak után kialakulnak az idegrendszeri tünetek: fej-, nyak-, gerincfájdalom a végtagok fájdalmával, érzékszavarával, bénulással. A tünetek pár nappal az általános, bevezető panaszok után jelentkeznek és 8-10 napig tartanak. Az izmok bénulása véglegessé válhat, amely életre szóló mozgáskorlátozottságot, légzési nehézséget okoz.

### **Haemophilus influenzae b**

#### **Milyen betegséget okoz a Haemophilus influenzae b baktérium?**

A Haemophilus influenzae baktérium „b” típusa (Hib) agyhártyagyulladást, a légúti nyálkahártya és a gégefedő nyálkahártyájának gyulladást okozza. A betegség cseppfertőzéssel terjed.

#### **Melyek a Hib baktérium okozta betegség tünetei?**

Csecsemőkorban egyetlen tünete a bágyadtság, táplálhatatlanság lehet, vagy láztalan állapot mellett jelentkező szapora szívvérzés, sápadt bőrszín is jelezheti a betegséget. A Hib fertőzések nagyobb részében gennyes agyhártyagyulladás alakul ki, amely halálos is lehet.

### **Pneumococcus okozta betegségek elleni védőoltás**

#### **Mikor esedékes a pneumococcus elleni védőoltás?**

A védőoltást betöltött 2 és 4 hónapos korban kapják meg a csecsemők. A teljeskörű védettséghez szükséges emlékeztető oltásra 12 hónapos korban kerül sor.

#### **Mire számíthat a pneumococcus elleni oltás után?**

Előfordulhat láz, aluszékonyság és/vagy álmatlanság, étvágytalanság, ingerlékenység, illetve helyi reakció (bőrpír, duzzanat) megjelenése.

#### **Milyen betegséget okoz a pneumococcus baktérium?**

A pneumococcus baktérium számos súlyos betegséget okoz, mint pl. tüdőgyulladást, középfülgyulladást, agyhártyagyulladást.

#### **Hogyan terjed a pneumococcus baktérium?**

A baktérium az egészségesek torok-, és orrváladékában is jelen lehet, innen terjed át egyik emberről a másikra cseppfertőzéssel, leggyakrabban köhögéssel és tüsszentéssel.

#### **Melyek a pneumococcus okozta betegségek tünetei?**

A pneumococcus baktérium okozta középfülgyulladás esetén láz, hányás, túlérzékenység, fülfájás jelezheti a megbetegedést. Tüdőgyulladás esetén hirtelen kezdetű láz, mellkasi fájdalom, nehézlégzés, köpetürítés és nagyfokú elesettség a jellemző. A pneumococcus baktérium a véráramba is bejuthat. Ez az állapot lázzal, hidegrázással, tudatzavarral járhat. A pneumococcus baktérium az agyburkon is képes megtapadni és gennyes agyhártyagyulladást okozni. Az agyhártyagyulladás tarkómerevséggel, magas lázzal, hányással, eszméletvesztéssel jár. A gyors és megfelelő orvosi ellátás ellenére is tartós károsodás maradhat. Az agyhártyagyulladás, a véráramfertőzés és a tüdőgyulladás halálos kimenetelű is lehet.