



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT

Védőnői tájékoztatók az életkorhoz kötött kötelező gyermekkorai védőoltásokról

Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály

Budapest, 2024.

Védőnői Szolgálat neve:

Címe

Körzetazonosítója:

Területi védőnő neve:

Alapnyilvántartási száma:

Munkahelyi telefonszáma: Munkahelyi mobilszáma:

Munkahelyi egyedi e-mail címe:

Védőnői tájékoztató a BCG védőoltásról

[18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről]

Milyen betegség ellen véd a BCG védőoltás?

Az újszülöttkori BCG oltás a gyermekek súlyos tuberkulózisa ellen ad védelmet.

Milyen betegség a tuberkulózis?

A tuberkulózis (TBC), más néven gümőkór egy baktérium okozta fertőző betegség.

Hogyan terjed a tuberkulózis?

A tuberkulózis cseppfertőzéssel (pl. köhögés) terjed, de fertőzött állatok nyers teje is közvetítheti.

Melyek a TBC tünetei?

Elhúzódó láz és köhögés, nyirokcsomó megnagyobbodás. Az immunrendszer állapotától függően a kórokozó elterjedhet a szervezetben nehezen gyógyítható súlyos betegséghez, akár halálhoz vezethet.

Mikor esedékes a BCG oltás?

Az újszülöttek a kórház elhagyása előtt kapják meg a védőoltást, a védettség kialakításához egyszeri oltás szükséges. Amennyiben a szülészeti intézményben az újszülött nem kapta meg az oltást, illetőleg nem intézményben született, akkor 4 héten belül, folyamatos oltás keretében szükséges azt pótolni. Speciális esetekben a szülészeti intézményben elmaradt BCG oltást minél korábbi életkorban, de maximum 1 éves korig kell elvégezni.

Mire számíthatok a BCG oltást követően?

Normál reakció esetén az oltást követő 2-4 hét múlva maximum 10 mm átmérőjű vörös csomó képződik az injekció helyén, amely maximális nagyságát 4-6 héttel az oltás után éri el. A csomó közepe gyakran pörkösödik vagy gennyesedik, amely lassan kitisztul és legkésőbb 4 hónappal az oltás után kis, fehér heggel gyógyul. Ezzel egy időben a hónalji és nyaki nyirokcsomók enyhe duzzanata is előfordulhat. Nagyon ritkán 3-4 héttel az oltás után 1-2 hétig hőemelkedés észlelhető. Amennyiben az oltási hely 10 mm-nél nagyobb vagy a hónalji nyirokcsomóban tályog képződik, arról értesíteni kell a gyermek háziorvosát. Akinél az oltást követően nem alakul ki heg, annak sem szükséges újraoltás.

Gyermeke egészségéért Ön tehet a legtöbbet! Gondoljon még ma a holnapra!

Megelőzés. Védelem. Védőoltás.

A gyermek neve:

Születési helye:

Születési ideje:

TAJ száma:

Anyja születési neve:

Lakcíme:

Kérem, hogy mivel gyermeke nem kapta meg a védőoltást a kórházban / olyan helyen született, ahol ezt nem kaphatta meg, vegye fel a kapcsolatot a intézménnyel, majd az egyeztetett időpontban vigye el oda a gyermekét, hogy megkaphassa a BCG védőoltást.

Az oltás beadásakor vigye magával a Gyermek-egészségügyi kiskönyvet.

Az oltathatóság elbírálása orvosi feladat. Az oltóanyag nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival vagy bármely segédanyagával szembeni ismert túlérzékenységnél. Heveny, lázas betegség fennállásakor a védőoltást el kell halasztani, azonban az elmaradt oltásokat mielőbb pótolni szükséges.

Ha gyermeke a védőoltást már megkapta, vagy a védőoltás beadása alól végleges mentességet kapott, akkor ezt igazolni szükséges.

Tájékoztatom arról is, hogy amennyiben gyermeke kötelező védőoltása, megalapozott orvosi indok nélkül többszöri értesítés ellenére elmarad, akkor az illetékes járási/kerületi hivatal hatósági eljárást indít a szülő/gondviselő ellen.

A védőoltáshoz alkalmazott oltóanyagról a BCG oltás beadására kijelölt intézmény ad tájékoztatást. Az oltóanyag alkalmazási előirata, betegtájékoztatója elérhető: <https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis> oldalon.

Dátum: év hónap nap

Ph

.....
területi védőnő aláírása

Alapnyilvántartási száma:

A BCG védőoltásról szóló védőnői tájékoztató 1 példányát átvettem:

Dátum: év hónap nap

.....
szülő/gondviselő aláírása

Védőnői Szolgálat neve:

Címe

Körzetazonosítója:

Területi védőnő neve:

Alapnyilvántartási száma:

Munkahelyi telefonszáma: Munkahelyi mobilszáma:

Munkahelyi egyedi e-mail címe:

Védőnői tájékoztató a DTPa+IPV+Hib és a pneumococcus okozta betegségek elleni védőoltásról

[18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről]

DTPa+IPV+Hib elleni védőoltás

Milyen betegségek ellen véd a DTPa+IPV+Hib védőoltás?

A védőoltás 5 súlyos betegség a **torokgyík** (diftéria, D), a **merevgörcs** (tetanusz, T), a **szamárköhögés** (pertussis, Pa), a **járványos gyermekbénulás** (IPV) és a **b típusú Haemophilus influenzae fertőzés** (Hib) ellen véd.

Mikor esedékes a DTPa+IPV+Hib védőoltás?

A csecsemők 2, 3, 4, és 18 hónapos korban egy szúrással 5 betegség ellen kapnak védőoltást.

Mire számíthat a DTPa+IPV+Hib elleni oltás után?

Az oltás helyén mérsékelt duzzanat és bőrpír alakulhat ki. Az oltás után láz is jelentkezhet, ezért a testhőmérsékletet rendszeresen ellenőrizni kell, hogy időben el lehessen kezdeni a lázcsillapítást.

Diftéria

Milyen betegség a diftéria?

A diftéria, más néven torokgyík, súlyos fertőző betegség, amelyet egy baktérium okoz. A torokgyík cseppfertőzéssel terjed.

Melyek a diftéria tünetei?

A diftéria torokfájással, lázzal, rossz közérzettel, rekedtséggel jár. A garatban, a gégen, a mandulákon, az orrban vaskos, szürke lepedéket képez, amely fulladást okozhat. A betegség súlyos lefolyású, a megbetegedettek negyede belehalhat a fertőzésbe.

Tetanusz

Milyen betegség a tetanusz?

A tetanusz, más néven merevgörcs, egy súlyos, baktérium okozta betegség. A baktérium az emberi szervezetbe sérüléseken keresztül jut be, emberről-emberre nem terjed. Fertőzési veszélyt jelent az állati harapás, az égési sérülés, a vágott vagy szúrt seb is.

Melyek a tetanusz tünetei?

A tetanusz első tünete általában a szájzár, majd ezt követi a nyak és az arcizmok görcse, aminek hatására torz mosolyban rögzül az arc. Izommerevség alakul ki, amelyhez rohamokban jelentkező a gerincre és a végtagokra is kiterjedő izomgörcsök társulnak. Ezek csonttörést és akár a gerincoszlop törését is okozhatják. A gége és a légző izmok görcse fulladáshoz vezethet.

Szamárköhögés

Milyen betegség a szamárköhögés?

A szamárköhögés egy baktérium okozta heveny fertőző betegség. A szamárköhögés cseppfertőzéssel terjed, leggyakrabban köhögéssel, tüsszögéssel, vagy beteg emberrel hosszabb ideig, egy légtérben való tartózkodással.

Melyek a számarköhögés tünetei?

A hurutos betegség kezdetén orrfolyás, hőemelkedés, kötőhártya gyulladás jelentkezhet. A kezdeti tüneteket több hetes száraz köhögés követheti. A kínzó, belégzést kísérő köhögésnek jellegzetes hangja van, innen ered a számarköhögés elnevezés. A csecsemők körében különösen nagy a veszélye a légzésleállásnak.

Járványos gyermekbénulás

Milyen betegség a járványos gyermekbénulás?

A járványos gyermekbénulás egy heveny fertőző betegség, amelyet a poliovírus okoz. A vírus széklettel szennyezett kézzől, tárgyakról, élelmiszer, víz közvetítésével jut a szervezetbe.

Melyek a járványos gyermekbénulás tünetei?

A legtöbb esetben a betegség tünetmentes. A tünetes betegség rövid ideig tartó lázzal, felső légúti illetve hasmenéses tünetekkel kezdődik. Az esetek 5%-ban néhány napos láztalan időszak után kialakulnak az idegrendszeri tünetek: fej-, nyak-, gerincfájdalom a végtagok fájdalmával, érzészavarával, bénulással. A tünetek pár nappal az általános, bevezető panaszok után jelentkeznek és 8-10 napig tartanak. Az izmok bénulása véglegessé válhat, amely életre szóló mozgáskorlátozottságot, légzési nehézséget okoz.

Haemophilus influenzae b

Milyen betegséget okoz a Haemophilus influenzae b baktérium?

A Haemophilus influenzae baktérium „b” típusa (Hib) agyhártyagyulladást, a légúti nyálkahártya és a gégefedő nyálkahártyájának gyulladását okozza. A betegség cseppfertőzéssel terjed.

Melyek a Hib baktérium okozta betegség tünetei?

Csecsemőkorban egyetlen tünete a bágyadság, táplálhatatlanság lehet, vagy láztalan állapot mellett jelentkező szapora szívverés, sápadt bőrszín is jelezheti a betegséget. A Hib fertőzések nagyobb részében gennyes agyhártyagyulladás alakul ki, amely halálos is lehet.

Pneumococcus okozta betegségek elleni védőoltás

Mikor esedékes a pneumococcus elleni védőoltás?

A védőoltást betöltött 2 és 4 hónapos korban kapják meg a csecsemők. A teljeskörű védettséghez szükséges emlékeztető oltásra 12 hónapos korban kerül sor.

Mire számíthat a pneumococcus elleni oltás után?

Előfordulhat láz, aluszékonyság és/vagy álmatlanság, étvágytalanság, ingerlékenység, illetve helyi reakció (bőrpír, duzzanat) megjelenése.

Milyen betegséget okoz a pneumococcus baktérium?

A pneumococcus baktérium számos súlyos betegséget okoz, mint pl. tüdőgyulladást, középfülgyulladást, agyhártyagyulladást.

Hogyan terjed a pneumococcus baktérium?

A baktérium az egészségesek torok-, és orrváladékában is jelen lehet, innen terjed át egyik emberről a másikra cseppfertőzéssel, leggyakrabban köhögéssel és tüsszentéssel.

Melyek a pneumococcus okozta betegségek tünetei?

A pneumococcus baktérium okozta középfülgyulladás esetén láz, hányás, túlérzékenység, fülfájás jelezheti a megbetegedést. Tüdőgyulladás esetén hirtelen kezdetű láz, mellkasi fájdalom, nehézlégzés, köpetürítés és nagyfokú elesettség a jellemző. A pneumococcus baktérium a véráramba is bejuthat. Ez az állapot lázzal, hidegrázással, tudatzavarral járhat. A pneumococcus baktérium az agyburkon is képes megtapadni és gennyes agyhártyagyulladást okozni. Az agyhártyagyulladás tarkómerevséggel, magas lázzal, hányással, eszméletvesztéssel jár. A gyors és megfelelő orvosi ellátás ellenére is tartós károsodás maradhat. Az agyhártyagyulladás, a véráramfertőzés és a tüdőgyulladás halálos kimenetelű is lehet.

Gyermeke egészségéért Ön tehet a legtöbbet! Gondoljon még ma a holnapra!

Megelőzés. Védelem. Védőoltás.

A gyermek neve:

Születési helye:

Születési ideje:

TAJ száma:

Anyja születési neve:

Lakcíme:

Kérem, hogy vigye el gyermekét az őt ellátó háziorvoshoz az egyeztetett tanácsadás idejében, hogy megkaphassa a DTPa+IPV+Hib és a pneumococcus okozta betegségek elleni védőoltást.

Az oltás beadásakor vigye magával a Gyermek-egészségügyi kiskönyvet.

Az oltathatóság elbírálása orvosi feladat. Az oltóanyag nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival vagy bármely segédanyagával szembeni ismert túlérzékenységnél. Heveny, lázas betegség fennállásakor a védőoltást el kell halasztani, azonban az elmaradt oltásokat mielőbb pótolni szükséges.

Ha gyermeke a védőoltást már megkapta, vagy a védőoltás beadása alól végleges mentességet kapott, akkor ezt igazolni szükséges.

Tájékoztatom arról is, hogy amennyiben gyermeke kötelező védőoltása, megalapozott orvosi indok nélkül többszöri értesítés ellenére elmarad, akkor az illetékes járási/kerületi hivatal hatósági eljárást indít a szülő/gondviselő ellen.

A védőoltáshoz alkalmazott oltóanyagokról a gyermeket ellátó háziorvos ad tájékoztatást, amely oltóanyagok alkalmazási előirata, betegtájékoztatója elérhető: <https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis> oldalon.

Dátum: év hónap nap

Ph

.....
területi védőnő aláírása

Alapnyilvántartási száma:

A DTPa+IPV+Hib és a pneumococcus védőoltásról a védőnői tájékoztató 1 példányát átvettem:

Dátum: év hónap nap

.....
szülő/gondviselő aláírása

Védőnői Szolgálat neve:

Címe:

Körzetazonosítója:

Területi védőnő neve:

Alapnyilvántartásiszáma:

Munkahelyi telefonszáma: Munkahelyi mobilszáma:

Munkahelyi egyedi e-mail címe:

Védőnői tájékoztató a DTPa+IPV+Hib védőoltásról

[18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről]

DTPa+IPV+Hib elleni védőoltás

Milyen betegségek ellen véd a DTPa+IPV+Hib védőoltás?

A védőoltás 5 súlyos betegség a **torokgyík** (diftéria, D), a **merevgörcs** (tetanusz, T), a **szamárköhögés** (pertussis, Pa), a **járványos gyermekbénulás** (IPV) és a **b típusú Haemophilus influenzae fertőzés** (Hib) ellen véd.

Mikor esedékes a DTPa+IPV+Hib védőoltás?

A csecsemők 2, 3, 4, és 18 hónapos korban egy szúrással 5 betegség ellen kapnak védőoltást.

Mire számíthat a DTPa+IPV+Hib elleni oltás után?

Az oltás helyén mérsékelt duzzanat és bőrpír alakulhat ki. Az oltás után láz is jelentkezhet, ezért a testhőmérsékletet rendszeresen ellenőrizni kell, hogy időben el lehessen kezdeni a lázcsillapítást.

Diftéria

Milyen betegség a diftéria?

A diftéria, más néven torokgyík, súlyos fertőző betegség, amelyet egy baktérium okoz. A torokgyík cseppfertőzéssel terjed.

Melyek a diftéria tünetei?

A diftéria torokfájással, lázzal, rossz közérzettel, rekedtséggel jár. A garatban, a gégen, a mandulákon, az orrban vaskos, szürke lepedéket képez, amely fulladást okozhat. A betegség súlyos lefolyású, a megbetegedettek negyede belehalhat a fertőzésbe.

Tetanusz

Milyen betegség a tetanusz?

A tetanusz, más néven merevgörcs, egy súlyos, baktérium okozta betegség. A baktérium az emberi szervezetbe sérüléseken keresztül jut be, emberről-emberre nem terjed. Fertőzési veszélyt jelent az állati harapás, az égési sérülés, a vágott vagy szúrt seb is.

Melyek a tetanusz tünetei?

A tetanusz első tünete általában a szájzár, majd ezt követi a nyak és az arcizmok görcse, aminek hatására torz mosolyban rögzül az arc. Izommerevség alakul ki, amelyhez rohamokban jelentkező a gerinc és a végtagokra is kiterjedő izomgörcsök társulnak. Ezek csonttörést és akár a gerincoszlop törését is okozhatják. A gége és a légző izmok görcse fulladáshoz vezethet.

Szamárköhögés

Milyen betegség a szamárköhögés?

A szamárköhögés egy baktérium okozta heveny fertőző betegség. A szamárköhögés cseppfertőzéssel terjed, leggyakrabban köhögéssel, tüsszögéssel, vagy beteg emberrel hosszabb ideig, egy légtérben való tartózkodással.

Melyek a szamárköhögés tünetei?

A hurutos betegség kezdetén orrfolyás, hőemelkedés, kötőhártya gyulladás jelentkezhet. A kezdeti tüneteket több hetes száraz köhögés követheti. A kízó, belégzést kísérő köhögésnek jellegzetes hangja van, innen ered a szamárköhögés elnevezés. A csecsemők körében különösen nagy a veszélye a légzésleállásnak.

Járványos gyermekbénulás

Milyen betegség a járványos gyermekbénulás?

A járványos gyermekbénulás egy heveny fertőző betegség, amelyet a poliovírus okoz. A vírus széklettel szennyezett kézről, tárgyakról, élelmiszer, víz közvetítésével jut a szervezetbe.

Melyek a járványos gyermekbénulás tünetei?

A legtöbb esetben a betegség tünetmentes. A tünetes betegség rövid ideig tartó lázzal, felső légúti illetve hasmenéses tünetekkel kezdődik. Az esetek 5%-ban néhány napos láztalan időszak után kialakulnak az idegrendszeri tünetek: fej-, nyak-, gerincfájdalom a végtagok fájdalmával, érzészavarával, bénulással. A tünetek pár nappal az általános, bevezető panaszok után jelentkeznek és 8-10 napig tartanak. Az izmok bénulása véglegessé válhat, amely életre szóló mozgáskorlátozottságot, légzési nehézséget okoz.

Haemophilus influenzae b

Milyen betegséget okoz a Haemophilus influenzae b baktérium?

A Haemophilus influenzae baktérium „b” típusa (Hib) agyhártyagyulladást, a légúti nyálkahártya és a gégefedő nyálkahártyájának gyulladását okozza. A betegség cseppfertőzéssel terjed.

Melyek a Hib baktérium okozta betegség tünetei?

Csecsemőkorban egyetlen tünete a bágyadság, táplálhatatlanság lehet, vagy láztalan állapot mellett jelentkező szapora szívverés, sápadt bőrszín is jelezheti a betegséget. A Hib fertőzések nagyobb részében gennyes agyhártyagyulladás alakul ki, amely halálos is lehet.

Gyermeke egészségéért Ön tehet a legtöbbet! Gondoljon még ma a holnapra!

Megelőzés. Védelem. Védőoltás.

A gyermek neve:

Születési helye:

Születési ideje:

TAJ száma:

Anyja születési neve:

Lakcíme:

Kérem, hogy vigye el gyermekét az őt ellátó háziorvoshoz az egyeztetett tanácsadás idejében, hogy megkaphassa a DTPa+IPV+Hib elleni védőoltást.

Az oltás beadásakor vigye magával a Gyermek-egészségügyi kiskönyvet.

Az oltathatóság elbírálása orvosi feladat. Az oltóanyag nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival vagy bármely segédanyagával szembeni ismert túlérzékenységnél. Heveny, lázas betegség fennállásakor a védőoltást el kell halasztani, azonban az elmaradt oltásokat mielőbb pótolni szükséges.

Ha gyermeke a védőoltást már megkapta, vagy a védőoltás beadása alól végleges mentességet kapott, akkor ezt igazolni szükséges.

Tájékoztatom arról is, hogy amennyiben gyermeke kötelező védőoltása, megalapozott orvosi indok nélkül többszöri értesítés ellenére elmarad, akkor az illetékes járási/kerületi hivatal hatósági eljárást indít a szülő/gondviselő ellen.

A védőoltáshoz alkalmazott oltóanyagról a gyermeket ellátó háziorvos ad tájékoztatást, amely oltóanyag alkalmazási előirata, betegtájékoztatója elérhető: <https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis> oldalon.

Dátum: év hónap nap

Ph

.....
területi védőnő aláírása

Alapnyilvántartási száma:

A DTPa+IPV+Hib védőoltásról szóló védőnői tájékoztató 1 példányát átvettem:

Dátum: év hónap nap

.....
szülő/gondviselő aláírása

Védőnői Szolgálat neve:

Címe:

Körzetazonosítója:

Területi védőnő neve:

Alapnyilvántartási száma:

Munkahelyi telefonszáma: Munkahelyi mobilszáma:

Munkahelyi egyedi e-mail címe:

Védőnői tájékoztató a pneumococcus okozta betegségek elleni védőoltásról

[18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről]

Pneumococcus okozta betegségek elleni védőoltás

Mikor esedékes a pneumococcus elleni védőoltás?

A védőoltást betöltött 2 és 4 hónapos korban kapják meg a csecsemők. A teljeskörű védetséghez szükséges emlékeztető oltásra 12 hónapos korban kerül sor.

Mire számíthat a pneumococcus elleni oltás után?

Előfordulhat láz, aluszékonyság és/vagy álmatlanság, étvágytalanság, ingerlékenység, illetve helyi reakció (bőrpír, duzzanat) megjelenése.

Milyen betegséget okoz a pneumococcus baktérium?

A pneumococcus baktérium számos súlyos betegséget okoz, mint pl. tüdőgyulladást, középfülgyulladást, agyhártyagyulladást.

Hogyan terjed a pneumococcus baktérium?

A baktérium az egészségesek torok-, és orrváladékában is jelen lehet, innen terjed át egyik emberről a másikra cseppfertőzéssel, leggyakrabban köhögéssel és tüsszentéssel.

Melyek a pneumococcus okozta betegségek tünetei?

A pneumococcus baktérium okozta középfülgyulladás esetén láz, hányás, túlérzékenység, fülfájás jelezheti a megbetegedést. Tüdőgyulladás esetén hirtelen kezdetű láz, mellkasi fájdalom, nehézlégzés, köpetürítés és nagyfokú elesettség a jellemző. A pneumococcus baktérium a véráramba is bejuthat. Ez az állapot lázzal, hidegrázással, tudatzavarral járhat. A pneumococcus baktérium az agyburkon is képes megtapadni és gennyes agyhártyagyulladást okozni. Az agyhártyagyulladás tarkómerevséggel, magas lázzal, hányással, eszméletvesztéssel jár. A gyors és megfelelő orvosi ellátás ellenére is tartós károsodás maradhat. Az agyhártyagyulladás, a véráramfertőzés és a tüdőgyulladás halálos kimenetelű is lehet.

Gyermeke egészségéért Ön tehet a legtöbbet! Gondoljon még ma a holnapra!

Megelőzés. Védelem. Védőoltás.

A gyermek neve:

Születési helye:

Születési ideje:

TAJ száma:

Anyja születési neve:

Lakcíme:

Kérem, hogy vigye el gyermekét az őt ellátó háziorvoshoz az egyeztetett tanácsadás idejében, hogy megkaphassa a pneumococcus okozta betegségek elleni védőoltást.

Az oltás beadásakor vigye magával a Gyermek-egészségügyi kiskönyvet.

Az oltathatóság elbírálása orvosi feladat. Az oltóanyag nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival vagy bármely segédanyagával szembeni ismert túlérzékenységnél. Heveny, lázas betegség fennállásakor a védőoltást el kell halasztani, azonban az elmaradt oltásokat mielőbb pótolni szükséges.

Ha gyermeke a védőoltást már megkapta, vagy a védőoltás beadása alól végleges mentességet kapott, akkor ezt igazolni szükséges.

Tájékoztatatom arról is, hogy amennyiben gyermeke kötelező védőoltása, megalapozott orvosi indok nélkül többszöri értesítés ellenére elmarad, akkor az illetékes járási/kerületi hivatal hatósági eljárást indít a szülő/gondviselő ellen.

A védőoltáshoz alkalmazott oltóanyagról a gyermeket ellátó háziorvos ad tájékoztatást, amely oltóanyag alkalmazási előirata, betegtájékoztatója elérhető: <https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis> oldalon.

Dátum: év hónap nap

Ph

.....
területi védőnő aláírása

Alapnyilvántartási száma:

A Pneumococcus elleni védőoltásról szóló védőnői tájékoztató 1 példányát átvettem:

Dátum: év hónap nap

.....
szülő/gondviselő aláírása

Védőnői Szolgálat neve:

Címe:

Körzetazonosítója:

Területi védőnő neve:

Munkahelyi telefonszáma: Munkahelyi mobilszáma:

Munkahelyi egyedi e-mail címe:

Védőnői tájékoztató a bárányhimlő elleni védőoltásról

[18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről]

Milyen betegség a bárányhimlő?

A bárányhimlőt a Varicella-zoster vírus okozza, ragályos, kiütéssel járó betegség, amely leggyakrabban kisgyermekkorban jelentkezik.

Hogyan terjed a bárányhimlő?

A bárányhimlő cseppfertőzéssel terjed, a beteggel való közvetlen érintkezés, váladékokkal frissen szennyezett tárgyak útján.

Melyek a bárányhimlő tünetei?

Láz kíséretében, a test különböző részein jellegzetes, kezdetben apró, majd hólyagos kiütések jelentkeznek, amelyek pörkösödéssel gyógyulnak. A bárányhimlő leggyakrabban enyhe lefolyású, magától gyógyuló betegség, de számos esetben súlyos szövődménnyel jár. A szövődmények jelentős hányada a bőrt érinti, de kifejlődhetnek idegrendszeret érintő szövődmények, és tüdőgyulladás is. Fokozott a fertőzés kockázata a várandósság során megbetegedő kismamáknál, magzatjuknál, a szülés körül megbetegedő édesanyák újszülöttjei esetében.

Mikor esedékes a bárányhimlő elleni védőoltás?

A védőoltást betöltött 12 és 15 hónapos korban kapják meg a gyermekek. A 2018. július 31. után születettek számára a védőoltás kötelező.

Mire számíthat a bárányhimlő elleni oltás után?

Előfordulhat láz, gyorsan múló bőrjelenség (bárányhimlőszerű kiütés), jelentkezhet fájdalom és duzzanat az injekció beadásának helyén és ingerlékenység.

Gyermeke egészségéért Ön tehet a legtöbbet! Gondoljon még ma a holnapra!

Megelőzés. Védelem. Védőoltás.

A gyermek neve:

Születési helye:

Születési ideje:

TAJ száma:

Anyja születési neve:

Lakcíme:

Kérem, hogy vigye el gyermekét az őt ellátó háziorvoshoz a tanácsadás egyeztetett idejében, hogy megkaphassa a bárányhimlő elleni védőoltást.

Az oltás beadásakor vigye magával a Gyermekegészségügyi kiskönyvet.

Az oltathatóság elbírálása orvosi feladat. Az oltóanyag nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival vagy bármely segédanyagával szembeni ismert túlérzékenységnél. Heveny, lázas betegség fennállásakor a védőoltást el kell halasztani, azonban az elmaradt oltásokat mielőbb pótolni szükséges.

Tájékoztatok arról is, hogy amennyiben gyermeke kötelező védőoltása, megalapozott orvosi indok nélkül többszöri értesítés ellenére elmarad, akkor az illetékes járási/kerületi hivatal hatósági eljárást indít a szülő/gondviselő ellen.

Ha gyermeke a védőoltást már megkapta, vagy a védőoltás beadása alól végleges mentességet kapott, akkor ezt igazolni szükséges.

A védőoltáshoz alkalmazott oltóanyagról a gyermeket ellátó háziorvos ad tájékoztatást, amely oltóanyag alkalmazási előirata, beteg tájékoztatója elérhető: <https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis> oldalon.

Dátum: év hónap nap

Ph

.....
területi védőnő aláírása

Alapnyilvántartási száma:

A bárányhimlő elleni védőoltásról szóló védőnői tájékoztató 1 példányát átvettem:

Dátum: év hónap nap

.....
szülő/gondviselő aláírása

Védőnői Szolgálat neve:

Címe:

Körzetazonosítója:

Területi védőnő neve:

Munkahelyi telefonszáma: Munkahelyi mobilszáma:

Munkahelyi egyedi e-mail címe:

Védőnői tájékoztató a kanyaró, mumpsz és rózsahimlő elleni (MMR) védőoltásról

[18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről]

Milyen betegségek ellen véd az MMR védőoltás?

A védőoltás a három vírus által okozott betegségek ellen véd: a **kanyaró** (morbilli, M), a **mumpsz** (M) és a **rózsahimlő** (rubeola, R).

Mikor esedékes az MMR oltás?

A kisgyermek 15 hónapos korban, a serdülők pedig az általános iskola 6. osztályában egy szűrővizsgálattal kapnak a 3 betegség ellen védelmet.

Mire számíthat az MMR oltás után?

Az oltást követő 7. és 14. nap között ún. oltási betegség léphet fel lázzal, kiütéssel, esetleg nyálmirigy duzzanattal. A tünetek sokkal enyhébbek, mint a természetes betegségnél és 1-2 napnál nem tartanak tovább. 1 millió oltott közül egynél léphet fel súlyosabb szövődmény, agyvelőgyulladás formájában, ilyenkor kifejezett bágyadtság, aluszékonyság észlelhető, ami néhány nap alatt nyomtalanul eltűnik. Kisgyermek lázas állapota gondos megfigyelést és folyamatos lázcsillapítást igényel. Az oltást követő reakcióról minél hamarabb értesíteni kell az oltást végző orvost!

Kanyaró

Milyen betegség a kanyaró?

A kanyaró rendkívül ragályos, kiütéses betegség. A kanyaró cseppfertőzéssel terjed: köhögéssel, tüsszentéssel, beszéddel vagy a légúti váladékkal történő közvetlen érintkezés útján, illetve nyállal, orr-, torok váladékkal szennyezett használati eszközökön keresztül.

Melyek a kanyaró tünetei?

A kanyaró lázzal, orrfolyással, köhögéssel, kötőhártyagyulladással kezdődik, majd a fül mögött kiütések jelentkeznek, amelyek azután az egész törzsre, majd a végtagokra is áttérjednek. A leggyakoribb szövődménye a középfülgyulladás, a tüdőgyulladás, emellett előfordulhat hasmenés, agyvelőgyulladás, mely 1 000 kanyaróban megbetegedett közül egynél jelentkezik, tehát nagyságrendekkel gyakoribb, mint a védőoltás miatt esetleg kialakuló hasonló szövődmény. A fertőzéshez társuló agyvelőgyulladás után gyakran maradandó károsodás – halláskárosodás és értelmi fogyatékoság – alakul ki. A kanyaró szövődménye lehet a betegség kiállása után évekkel később jelentkező agyvelőgyulladás, ami halálhoz vezet.

Mumpsz

Milyen betegség a mumpsz?

A mumpsz vírus okozta betegség. A mumpsz cseppfertőzéssel terjed: leggyakrabban köhögéssel, tüsszentéssel, vagy a légúti váladékkal történő közvetlen érintkezés útján, illetve nyállal, légút-, orrváladékkal szennyezett használati eszközökön keresztül.

Melyek a mumpsz tünetei?

A mumpsz lázzal, elesettséggel járó megbetegedés, amely során az egyik oldali, majd a másik oldali fültőmirigy is begyulladhat. A fültőmirigyek a fül előtt és az állcsont alatt helyezkednek el mindkét oldalon. Gyulladásukkal az arc és a nyak megdagad és az érintett terület fájdalmassá válik. Serdülő fiúknál

szövődménye heregyulladás is lehet, amely súlyos, maradandó károsodást okozhat, akár a nemzőképesség elvesztéséhez is vezethet. A mumpszvírussal történő fertőződés után ritkán hasnyálmirigy gyulladás alakul ki. A mumpszos betegek egytizedénél fejfájással, hányással, aluszékonysággal járó agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás léphet fel.

Rózsahimlő (rubeola)

Milyen betegség a rózsahimlő?

A rózsahimlő, más néven rubeola, vírus okozta kiütéses fertőzőbetegség. A rózsahimlő cseppfertőzéssel terjed leggyakrabban köhögéssel, tüsszentéssel.

Melyek a rózsahimlő tünetei?

A rózsahimlő gyermekek esetében általában enyhe lefolyású kiütéses betegség, hőemelkedéssel, a tarkótájon megnagyobbodott nyirokcsomókkal, esetenként kötőhártyagyulladással. A várandósság során – elsősorban az első harmadában – átvészelt rózsahimlő vetélést vagy a magzat súlyos károsodását okozhatja.

Gyermeke egészségéért Ön tehet a legtöbbet! Gondoljon még ma a holnapra!

Megelőzés. Védelem. Védőoltás.

A gyermek neve:

Születési helye:

Születési ideje:

TAJ száma:

Anyja születési neve:

Lakcíme:

Kérem, hogy vigye el gyermekét az őt ellátó háziorvoshoz az egyeztetett tanácsadás idejében, hogy megkaphassa az MMR elleni védőoltást. Az oltás beadásakor vigye magával a Gyermekegészségügyi kiskönyvet.

Az olthatóság elbírálása orvosi feladat. Az oltóanyag nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival vagy bármely segédanyagával szembeni ismert túlérzékenységnél. Heveny, lázas betegség fennállásakor a védőoltást el kell halasztani, azonban az elmaradt oltásokat mielőbb pótolni szükséges.

Ha gyermeke a védőoltást már megkapta, vagy a védőoltás beadása alól végleges mentességet kapott, akkor ezt igazolni szükséges.

Tájékoztatok arról is, hogy amennyiben gyermeke kötelező védőoltása, megalapozott orvosi indok nélkül többszöri értesítés ellenére elmarad, akkor az illetékes járási/kerületi hivatal hatósági eljárást indít a szülő/gondviselő ellen.

A védőoltáshoz alkalmazott oltóanyagról a gyermeket ellátó háziorvos ad tájékoztatást, amely oltóanyag alkalmazási előirata, betegtájékoztatója elérhető: <https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis> oldalon.

Dátum: év hónap nap

Ph

.....
területi védőnő aláírása

Alapnyilvántartási száma:

A kanyaró, mumpsz és rózsahimlő elleni védőoltásról szóló védőnői tájékoztató 1 példányát átvettem:

Dátum: év hónap nap

.....
szülő/gondviselő aláírása

Védőnői Szolgálat neve:

Címe:

Körzetazonosítója:

Területi védőnő neve:

Alapnyilvántartásiszáma:

Munkahelyi telefonszáma: Munkahelyi mobilszáma:

Munkahelyi egyedi e-mail címe:

Védőnői tájékoztató a DTPa+IPV védőoltásról

[18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről]

Milyen betegségek ellen véd a DTPa+IPV védőoltás?

A védőoltás 4 súlyos betegség a **torokgyík** (diftéria, D), a **merevgörcs** (tetanusz, T), a **szamárköhögés** (pertussis, Pa), és a **járványos gyermekbénulás** (IPV) ellen véd.

Mikor esedékes a DTPa+IPV védőoltás?

A gyermekeket 6 éves korban oltják újra egy szúrással 4 betegség ellen.

Mire számíthat a DTPa+IPV elleni oltás után?

Az oltás helyén mérsékelt duzzanat és bőrpír alakulhat ki. Az oltás után láz is jelentkezhet, ezért a testhőmérsékletet rendszeresen ellenőrizni kell, hogy időben el lehessen kezdeni a lázcsillapítást.

Diftéria

Milyen betegség a diftéria?

A diftéria, más néven torokgyík, súlyos fertőző betegség, amelyet egy baktérium okoz. A torokgyík cseppfertőzéssel terjed.

Melyek a diftéria tünetei?

A diftéria torokfájással, lázzal, rossz közérzettel, rekedtséggel jár. A garatban, a gégén, a mandulákon, az orrban vaskos, szürke lepedéket képez, amely fulladást okozhat. A betegség súlyos lefolyású, a megbetegedettek negyede belehalhat a fertőzésbe.

Tetanusz

Milyen betegség a tetanusz?

A tetanusz, más néven merevgörcs, egy súlyos, baktérium okozta betegség. A baktérium az emberi szervezetbe sérüléseken keresztül jut be, emberről-emberre nem terjed. Fertőzési veszélyt jelent az állati harapás, az égési sérülés, a vágott vagy szúrt seb is.

Melyek a tetanusz tünetei?

A tetanusz első tünete általában a szájzár, majd ezt követi a nyak és az arcizmok görcse, aminek hatására torz mosolyban rögzül az arc. Izommerevség alakul ki, amelyhez rohamokban jelentkező a gerinc és a végtagokra is kiterjedő izomgörcsök társulnak. Ezek csonttörést és akár a gerincoszlop törését is okozhatják. A gége és a légző izmok görcse fulladáshoz vezethet.

Szamárköhögés

Milyen betegség a szamárköhögés?

A szamárköhögés egy baktérium okozta heveny fertőző betegség. A szamárköhögés cseppfertőzéssel terjed, leggyakrabban köhögéssel, tüsszögéssel, vagy beteg emberrel hosszabb ideig, egy légtérben való tartózkodással.

Melyek a számarköhögés tünetei?

A hurutos betegség kezdetén orrfolyás, hőemelkedés, kötőhártya gyulladás jelentkezhet. A kezdeti tüneteket több hetes száraz köhögés követheti. A kínzó, belégzést kísérő köhögésnek jellegzetes hangja van, innen ered a számarköhögés elnevezés. A csecsemők körében különösen nagy a veszélye a légzésleállásnak.

Járványos gyermekbénulás**Milyen betegség a járványos gyermekbénulás?**

A járványos gyermekbénulás egy heveny fertőző betegség, amelyet a poliovírus okoz. A vírus széklettel szennyezett kézzől, tárgyakról, élelmiszer, víz közvetítésével jut a szervezetbe.

Melyek a járványos gyermekbénulás tünetei?

A legtöbb esetben a betegség tünetmentes. A tünetes betegség rövid ideig tartó lázzal, felső légúti illetve hasmenéses tünetekkel kezdődik. Az esetek 5%-ban néhány napos láztalan időszak után kialakulnak az idegrendszeri tünetek: fej-, nyak-, gerincfájdalom a végtagok fájdalmával, érzészavarával, bénulással. A tünetek pár nappal az általános, bevezető panaszok után jelentkeznek és 8-10 napig tartanak. Az izmok bénulása véglegessé válhat, amely életre szóló mozgáskorlátozottságot, légzési nehézséget okoz.

Gyermeke egészségéért Ön tehet a legtöbbet! Gondoljon még ma a holnapra!

Megelőzés. Védelem. Védőoltás.

A gyermek neve:

Születési helye:

Születési ideje:

TAJ száma:

Anyja születési neve:

Lakcíme:

Kérem, hogy vigye el gyermekét az őt ellátó háziorvoshoz az egyeztetett tanácsadás idejében, hogy megkaphassa a DTPa+IPV elleni védőoltást.

Az oltás beadásakor vigye magával a Gyermekegészségügyi kiskönyvet.

Az olthatóság elbírálása orvosi feladat. Az oltóanyag nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival vagy bármely segédanyagával szembeni ismert túlérzékenységnél. Heveny, lázas betegség fennállásakor a védőoltást el kell halasztani, azonban az elmaradt oltásokat mielőbb pótolni szükséges.

Ha gyermeke a védőoltást már megkapta, vagy a védőoltás beadása alól végleges mentességet kapott, akkor ezt igazolni szükséges.

Tájékoztatom arról is, hogy amennyiben gyermeke kötelező védőoltása, megalapozott orvosi indok nélkül többszöri értesítés ellenére elmarad, akkor az illetékes járási/kerületi hivatal hatósági eljárást indít a szülő/gondviselő ellen.

A védőoltáshoz alkalmazott oltóanyagról a gyermeket ellátó háziorvos ad tájékoztatást, amely oltóanyag alkalmazási előirata, beteg tájékoztatója elérhető: <https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis> oldalon.

Dátum: év hónap nap

Ph

.....
területi védőnő aláírása

Alapnyilvántartási száma:

A DTPa+IPV védőoltásról szóló védőnői tájékoztató 1 példányát átvettem:

Dátum: év hónap nap

.....
szülő/gondviselő aláírása

Iskolaegészségügyi Szolgálat neve:.....

Címe:

Azonosítója:

Védőnő neve:.....

Munkahelyi telefonszáma: Munkahelyi mobilszáma:

Munkahelyi egyedi e-mail címe:

Védőnői tájékoztató a kanyaró, mumpsz és rózsahimlő elleni (MMR) újraoltásról

[18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről]

Milyen betegségek ellen véd az MMR védőoltás?

A védőoltás a három vírus által okozott betegségek ellen véd: a **kanyaró** (morbilli, M), a **mumpsz** (M) és a **rózsahimlő** (rubeola, R).

Mikor esedékes az MMR oltás?

A kisgyermek 15 hónapos korban, a serdülők pedig az általános iskola 6. osztályában egy szűrással kapnak a 3 betegség ellen védelmet.

Mire számíthat az MMR oltás után?

Az oltást követő 7. és 14. nap között ún. oltási betegség léphet fel lázzal, kiütéssel, esetleg nyálmirigy duzzanattal. A tünetek sokkal enyhébbek, mint a természetes betegségnél és 1-2 napnál nem tartanak tovább. 1 millió oltott közül egynél léphet fel súlyosabb szövődmény, agyvelőgyulladás formájában, ilyenkor kifejezett bágyadtság, aluszékonyság észlelhető, ami néhány nap alatt nyomtalanul eltűnik. Kisgyermek lázas állapota gondos megfigyelést és folyamatos lázcsillapítást igényel. Az oltást követő reakcióról minél hamarabb értesíteni kell az oltást végző orvost!

Kanyaró

Milyen betegség a kanyaró?

A kanyaró rendkívül ragályos, kiütéses betegség. A kanyaró cseppfertőzéssel terjed: köhögéssel, tüsszentéssel, beszéddel vagy a légúti váladékkal történő közvetlen érintkezés útján, illetve nyállal, orr-, torok váladékkal szennyezett használati eszközökön keresztül.

Melyek a kanyaró tünetei?

A kanyaró lázzal, orrfolyással, köhögéssel, kötőhártyagyulladással kezdődik, majd a fül mögött kiütések jelentkeznek, amelyek azután az egész törzsre, majd a végtagokra is áttérjednek. A leggyakoribb szövődménye a középfülgyulladás, a tüdőgyulladás, emellett előfordulhat hasmenés, agyvelőgyulladás, mely 1 000 kanyaróban megbetegedett közül egynél jelentkezik, tehát nagyságrendekkel gyakoribb, mint a védőoltás miatt esetleg kialakuló hasonló szövődmény. A fertőzéshez társuló agyvelőgyulladás után gyakran maradandó károsodás – halláskárosodás és értelmi fogyatékoság – alakul ki. A kanyaró szövődménye lehet a betegség kiállása után évekkel később jelentkező agyvelőgyulladás, ami halálhoz vezet.

Mumpsz

Milyen betegség a mumpsz?

A mumpsz vírus okozta betegség. A mumpsz cseppfertőzéssel terjed: leggyakrabban köhögéssel, tüsszentéssel, vagy a légúti váladékkal történő közvetlen érintkezés útján, illetve nyállal, légút-, orrváladékkal szennyezett használati eszközökön keresztül.

Melyek a mumpsz tünetei?

A mumpsz lázzal, elesettséggel járó megbetegedés, amely során az egyik oldali, majd a másik oldali fültőmirigy is begyulladhat. A fültőmirigyek a fül előtt és az állcsont alatt helyezkednek el mindkét oldalon. Gyulladásukkal az arc és a nyak megdagad és az érintett terület fájdalmassá válik. Serdülő fiúknál

szövődménye heregyulladás is lehet, amely súlyos, maradandó károsodást okozhat, akár a nemzőképesség elvesztéséhez is vezethet. A mumpszvírussal történő fertőződés után ritkán hasnyálmirigy gyulladás alakul ki. A mumpszos betegek egytizedénél fejfájással, hányással, aluszékonysággal járó agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás léphet fel.

Rózsahimlő (rubeola)

Milyen betegség a rózsahimlő?

A rózsahimlő, más néven rubeola, vírus okozta kiütéses fertőzőbetegség. A rózsahimlő cseppfertőzéssel terjed leggyakrabban köhögéssel, tüsszentéssel.

Melyek a rózsahimlő tünetei?

A rózsahimlő gyermekek esetében általában enyhe lefolyású kiütéses betegség, hőemelkedéssel, a tarkótájon megnagyobbodott nyirokcsomókkal, esetenként kötőhártyagyulladással. A várandósság során – elsősorban az első harmadában – átvészelt rózsahimlő vetélést vagy a magzat súlyos károsodását okozhatja.

Gyermeke egészségéért Ön tehet a legtöbbet! Gondoljon még ma a holnapra!

Megelőzés. Védelem. Védőoltás.

A gyermek neve:

Születési helye:

Születési ideje:

TAJ száma:

Anyja születési neve:

Lakcíme:

Tájékoztatom, hogy az MMR oltóanyaggal végzendő védőoltás iskolai kampányoltás keretében történik, az oltást az iskolaorvos adja be, hiányzás esetén is az iskolaorvos fogja pótolni az elmaradt oltást. Az oltás beadásakor a gyermek vigye magával a Gyermekek-egészségügyi kiskönyvet.

Az oltathatóság elbírálása orvosi feladat. Az oltóanyag nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival vagy bármely segédanyagával szembeni ismert túlérzékenységnél. Heveny, lázas betegség fennállásakor a védőoltást el kell halasztani, azonban az elmaradt oltásokat mielőbb pótolni szükséges.

Ha gyermeke a védőoltását már megkapta, vagy a védőoltás beadása alól végleges mentességet kapott, akkor ezt igazolni szükséges.

Tájékoztatom arról is, hogy amennyiben gyermeke kötelező védőoltása, megalapozott orvosi indok nélkül többszöri értesítés ellenére elmarad, akkor az illetékes járási/kerületi hivatal hatósági eljárást indít a szülő/gondviselő ellen.

A védőoltás ideje:

A védőoltás helye:

A védőoltáshoz alkalmazott oltóanyag neve:

Az alkalmazási előírat, beteg tájékoztató elérhető: <https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis>

Dátum: év hónap nap

Ph

.....
iskolaegészségügyi feladatot ellátó védőnő aláírása

Alapnyilvántartási száma:

Az MMR védőoltásról szóló védőnői tájékoztató 1 példányát átvettem:

Dátum: év hónap nap

.....
szülő/gondviselő aláírása

Iskolaegészségügyi Szolgálat neve:.....

Címe:

Azonosítója:

Védőnő neve:.....

Munkahelyi telefonszáma: Munkahelyi mobilszáma:

Munkahelyi egyedi e-mail címe:

Védőnői tájékoztató a dTap védőoltásról

[18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről]

Milyen betegségek ellen véd a dTap védőoltás?

A védőoltás 3 súlyos betegség a **torokgyík** (diftéria, d), a **merevgörccs** (tetanusz, T), a **szamárköhögés** (pertussis, ap) ellen véd.

Mikor esedékes a dTap védőoltás?

A serdülőket az általános iskola 6. osztályában oltják újra diftéria, tetanusz és szamárköhögés (dTap) ellen.

Mire számíthat a dTap elleni oltás után?

Az oltás helyén mérsékelt duzzanat és bőrpír alakulhat ki. Az oltás után láz is jelentkezhet, ezért a testhőmérsékletet rendszeresen ellenőrizni kell, hogy időben el lehessen kezdeni a lázcsillapítást.

Diftéria

Milyen betegség a diftéria?

A diftéria, más néven torokgyík, súlyos fertőző betegség, amelyet egy baktérium okoz. A torokgyík cseppfertőzéssel terjed.

Melyek a diftéria tünetei?

A diftéria torokfájással, lázzal, rossz közérzettel, rekedtséggel jár. A garatban, a gégen, a mandulákon, az orrban vaskos, szürke lepedéket képez, amely fulladást okozhat. A betegség súlyos lefolyású, a megbetegedettek negyede belehalhat a fertőzésbe.

Tetanusz

Milyen betegség a tetanusz?

A tetanusz, más néven merevgörccs, egy súlyos, baktérium okozta betegség. A baktérium az emberi szervezetbe sérüléseken keresztül jut be, emberről-emberre nem terjed. Fertőzési veszélyt jelent az állati harapás, az égési sérülés, a vágott vagy szúrt seb is.

Melyek a tetanusz tünetei?

A tetanusz első tünete általában a szájzár, majd ezt követi a nyak és az arcizmok görcse, aminek hatására torz mosolyban rögzül az arc. Izommerevség alakul ki, amelyhez rohamokban jelentkező a gerincre és a végtagokra is kiterjedő izomgörcsök társulnak. Ezek csonttörést és akár a gerincoszlop törését is okozhatják. A gége és a légző izmok görcse fulladáshoz vezethet.

Szamárköhögés

Milyen betegség a szamárköhögés?

A szamárköhögés egy baktérium okozta heveny fertőző betegség. A szamárköhögés cseppfertőzéssel terjed, leggyakrabban köhögéssel, tüszögéssel, vagy beteg emberrel hosszabb ideig, egy légtérben való tartózkodással.

Melyek a szamárköhögés tünetei?

A hurutos betegség kezdetén orrfolyás, hőemelkedés, kötőhártya gyulladás jelentkezhet. A kezdeti tüneteket több hetes száraz köhögés követheti. A kínzó, belégzést kísérő köhögésnek jellegzetes hangja van, innen ered a szamárköhögés elnevezés. A csecsemők körében különösen nagy a veszélye a légzésleállásnak.

Gyermeke egészségéért Ön tehet a legtöbbet! Gondoljon még ma a holnapra!

Megelőzés. Védelem. Védőoltás.

A gyermek neve:

Születési helye:

Születési ideje:

TAJ száma:

Anyja születési neve:

Lakcíme:

Tájékoztatom, hogy a dTap védőoltás beadása iskolai kampányoltás keretében történik, az oltást az iskolaorvos adja be, hiányzás esetén is az iskolaorvos fogja pótolni az elmaradt oltást. Az oltás beadásakor a gyermek vigye magával a Gyermek-egészségügyi kiskönyvet.

Az oltathatóság elbírálása orvosi feladat. Az oltóanyag nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival vagy bármely segédanyagával szembeni ismert túlérzékenységnél. Heveny, lázas betegség fennállásakor a védőoltást el kell halasztani, azonban az elmaradt oltásokat mielőbb pótolni szükséges.

Ha gyermeke a védőoltását már megkapta, vagy a védőoltás beadása alól végleges mentességet kapott, akkor ezt igazolni szükséges.

Tájékoztatom arról is, hogy amennyiben gyermeke kötelező védőoltása, megalapozott orvosi indok nélkül többszöri értesítés ellenére elmarad, akkor az illetékes járási/kerületi hivatal hatósági eljárást indít a szülő/gondviselő ellen.

A védőoltás ideje:

A védőoltás helye:

A védőoltáshoz alkalmazott oltóanyag neve:

Az alkalmazási előírat, beteg tájékoztató elérhető: <https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis>

Dátum: év hónap nap

Ph

.....
iskolaegészségügyi feladatot ellátó védőnő aláírása

Alapnyilvántartási száma:

A dTap védőoltásról szóló védőnői tájékoztató 1 példányát átvettem:

Dátum: év hónap nap

.....
szülő/gondviselő aláírása

Iskolaegészségügyi Szolgálat neve:.....

Címe:

Azonosítója:

Védőnő neve:.....

Munkahelyi telefonszáma: Munkahelyi mobilszáma:

Munkahelyi egyedi e-mail címe:

Védőnői tájékoztató a Hepatitis B elleni védőoltásról

[18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről]

Milyen betegséget okoz a hepatitis B vírus?

A hepatitis B vírussal (HBV) történő fertőződés lehet tünetmentes, vagy átlagosan 2-3 hónapos lappangási idő után heveny májgyulladás alakulhat ki. A tünetmentes fertőzöttek, illetve a betegek egy része krónikus vírushordozóvá válhat, amely az évek előrehaladtával májelégtelenséghez, májzsugorhoz, májrákhoz vezethet.

Hogyan terjed a hepatitis B vírus?

A hepatitis B vírus terjesztésében a vérnek van elsődleges szerepe, bár a kórokozó a vírushordozó személy nyálában, vérében, ondójában, hüvelyváladékában és egyéb testnedveiben is kimutatható. A hepatitis B fertőzés történhet szexuális kontaktus következtében, minimális mennyiségű véréssel járó véletlenszerű sérülés/karcolás eredményeként, rosszul sterilizált fecskendő vagy injekciós tű közvetítésével, tetoválás, fülcimpa vagy orr lyukasztása, akupunktúra révén, közös borotva, fogkefe használata révén, valamint a vírushordozó várandós szülés közben megfertőzheti újszülöttjét.

Melyek a hepatitis B okozta fertőző májgyulladás tünetei?

A heveny májgyulladás általános tünetekkel kezdődhet: étvágytalanság, gyengeség, hányinger, hányás, láz, ízületi- és izomfájdalom, jobb bordaív alatti fájdalom, amit a vizelet besötétedése, a széklet kivilágosodása és a bőr, illetve a szem besárgulása követ. A HBV fertőzöttek jelentős hányada nem észleli a betegséget, de élete későbbi szakaszában krónikus májbetegé válhat.

Az idült HBV-fertőzés kezelés nélkül krónikus májgyulladást, 5-15 év alatt májzsugort, 15-25 év alatt májrákot okozhat. A különböző életkorokban történt fertőzések esetén változó a krónikus fertőzés kialakulásának esélye. Az újszülöttkorban szerzett fertőzés esetén az éretlen immunrendszer nem ismeri fel a kórokozót, ami több mint 90%-ban krónikus fertőzéshez, majd ezek szövődményeihez vezet.

Mikor esedékes a Hepatitis B vírus elleni oltás?

Magyarországon az általános iskola 7. évfolyamát végzők a két oltásból álló hepatitis B elleni oltást az iskolai tanév szeptemberében, illetve márciusában kapják meg. A beadandó oltások száma az oltandó életkorától függően változhat.

Mire számíthat a hepatitis B vírus elleni oltás után?

Gyakori a fájdalom, bőrpír, duzzanat az injekció beadásának helyén, fáradtság, láz, rossz közérzet, fejfájás. Ritkán előfordulhat szédülés, izomfájdalom, viszketés, bőrkiütés, ízületi bántalom.

Gyermeke egészségéért Ön tehet a legtöbbet! Gondoljon még ma a holnapra!

Megelőzés. Védelem. Védőoltás.

A gyermek neve:

Születési helye:

Születési ideje:

TAJ száma:

Anyja születési neve:

Lakcíme:

Tájékoztatom, hogy a Hepatitis B elleni védőoltás beadása iskolai kampányoltás keretében történik, az oltást az iskolaorvos adja be, hiányzás esetén is az iskolaorvos fogja pótolni az elmaradt oltást. Az oltás beadásakor a gyermek vigye magával a Gyermek-egészségügyi kiskönyvet.

Az oltathatóság elbírálása orvosi feladat. Az oltóanyag nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival vagy bármely segédanyagával szembeni ismert túlérzékenységnél. Heveny, lázas betegség fennállásakor a védőoltást el kell halasztani, azonban az elmaradt oltásokat mielőbb pótolni szükséges.

Ha gyermeke a védőoltását már megkapta, vagy a védőoltás beadása alól végleges mentességet kapott, akkor ezt igazolni szükséges.

Tájékoztatom arról is, hogy amennyiben gyermeke kötelező védőoltása, megalapozott orvosi indok nélkül többszöri értesítés ellenére elmarad, akkor az illetékes járási/kerületi hivatal hatósági eljárást indít a szülő/gondviselő ellen.

A védőoltás ideje:

A védőoltás helye:

A védőoltáshoz alkalmazott oltóanyag neve:

Az alkalmazási előírat, beteg tájékoztató elérhető: <https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis>

Dátum: év hónap nap

Ph

.....
iskolaegészségügyi feladatot ellátó védőnő aláírása

Alapnyilvántartási száma:

A Hepatitis B elleni védőoltásról szóló védőnői tájékoztató 1 példányát átvettem:

Dátum: év hónap nap

.....
szülő/gondviselő aláírása